

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部  
普濟方卷三百四十九

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣李大任

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十九 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

產後惡血衝心 附論

夫產後氣血挾於寒寒搏於血血則凝滯不消逆上者血隨氣上搶擊於心也凡產後餘血不盡因虛冷則留結與氣相搏必痛若遇久寒者血結彌甚則變成血瘕致令月水否澁不通也○又云餘血奔心蓋是分娩了

不即與童子小便以逐瘀血及卧太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

方

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉大虛者方

出拔萃方

乾荷葉 生地黄 乾 牡丹皮 等分

右濃煎湯調生蒲黃二錢一服即定四物湯加柴胡小柴胡加生乾地黄等分煎服亦可

捲荷散

出醫方大成

治產後血上衝心血刺血暈氣血腹痛

惡露不盡

初出荷捲

紅花

當歸

各一兩

蒲黃

細炒

丹皮

各半兩

右為細末每服二錢半空心溫酒送下一方內只使童子小便調如纔產後便服此藥即諸疾不生

荷葉散 療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶不識人

荷葉

六分

延胡索

八分

地黃汁

二合

右水二升煮三味取八合下延胡索空心三服忌肉

食一日

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕

出肘

後方

當歸 桂心 川芎 吳茱萸 橘皮

生薑

各二兩

芍藥

三兩

右呖咀以水三升煮取一升去滓空心服

治產後餘血攻心

出大全良方

用陳白梅槌碎濃煎湯服

金黃散

出大全良方

治產後惡血衝心時發躁

延胡索

一兩

蒲黃

半兩

桂心

一分

右為細末烏梅煎湯冷調下一錢

生地黃湯

出大全良方

治產後餘血奔心煩悶不知便與童

子小便以逐瘀血及睡太疾無食不宜食之物

生地黃

川芎

一兩

枳殼

芍藥

半兩

右為末酒服方寸匕日三服

赤鯉魚鱗

二兩燒灰

蜚蠊

半兩微炒黃去翅足

狗膽

半兩乾者

蒲黃

半兩

亂髮

二兩  
燒灰

麝香

二兩  
細研

右同研令細不計時候煎生姜湯童子小便調下一

錢

麒麟竭

出聖  
惠方

治產後惡血衝心痛氣欲絕

麒麟竭

二兩

沒藥

一兩

木香

一兩

代赭

半兩

麝香

半兩

細研

右搗細羅為散每服煎當歸酒調下二錢如人行五

七里候再服當下惡神效

沒藥散

治產後惡血衝心悶絕疼痛不可忍



沒藥 麒麟竭 當歸剉微炒 芫花炒 姜黃

金羅華

凌霄花

已上各半兩

麝香

一錢細研

狗膽

二枚乾者

右為散入研了藥令勻以醋煮麪糊和為丸如梧桐子大不計時候以溫酒調下

芫花丸

出聖惠方

治產後惡血衝眼前黑暗或生寒熱或時

狂語或腹痛不可忍

芫花

香墨

釜下墨

當歸

切微炒

姜黃

葳靈仙

已上各一兩

砒黃

半兩

右搗羅為末生薑汁一盞醋一盞同煎藥為膏入神麴末半兩和為丸如菜豆大不計時候煎當歸酒

化下七丸

治產後惡血衝心迷悶

出聖惠方

生地黃汁

半中盞

凌霄根汁

半中盞

檳榔

二枚剉

羚羊角屑

半兩

右相和煎至七沸入酒三合分三服溫服

又方

出聖惠方

羚羊角

一兩  
燒灰

麝香一錢

右相和細研為散不計時候以熱酒調下一錢

又方

出聖  
惠方

黑豆

二合  
醋一大  
蓋

右煎醋令極沸然後投入黑豆煎三兩沸便濾出每服用半合或入煎湯一合相合溫服血暈者服亦効

又方

出聖  
惠方

鷄子

一枚

米泔

一合

醋

二合

右先煎醋及泔三兩沸入鷄子攪令勻不計時候服  
半合

地黃飲子

出聖惠方

治產後惡血衝悶亂口乾

生地黃汁

三合藕汁三合

童子小便

三合

右相和煎三兩沸分溫二服

益母散

出聖惠方

治產後惡血衝心煩悶多渴

益母草

乾藕節

紅花子

各一兩

右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎

至六分去滓不計時溫服

療產後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊等疾

一名備急方出

大全良方

用大黃一兩為末以好醋半斤熬成膏以藥末搜膏為丸如梧子大溫醋湯吞五丸良久取下惡物不可多服亦治馬墜內損者及惡血不散服之神効

此藥難用大段虛弱不可服調藥醋不宜太酸恐傷肺臟兩家醫者斟酌

澤蘭散 治產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟

凡產前後諸病通治

澤蘭葉

石膏

研各二兩

白茯苓

卷栢

栢子

微炒別研

防風

厚朴

製

細辛

淨

桔梗

吳茱萸

炮炒各一兩

人參

藁本

乾姜

炮

五味子

白芷

白薇

半兩

川椒

開口者炒出汁

黃耆

川烏

炮

丹參

各三分

蕪荑

微炒赤

當歸

判

甘草

炙

川芎

芍藥

各一分

生乾地黃

二兩半

肉桂

一兩

阿膠

半兩炒一分

右為細末每服二錢空心臨卧熱酒調下加辰砂一字煎酸棗湯調一服安

血竭散 治產後敗血衝心胃滿氣喘命在須臾宜服此

真血竭 研

右細末三錢溫酒調服病勢危篤者盡二兩可活凡產後敗血衝心皆因惡露不下始則胃中微滿動加喘急者為難治產後所寶諸方無如此藥神速宜久

畜之以備急用

膏蜜湯 主產後餘血衝心痛急欲死方

猪膏

二升

白蜜

生地黄

切各一升

右膏煎地黄赤色出之內蜜和之令調分五服日三

紫金丹

治產後衝脹胃中有物狀似噎氣不降

代赭石

礞礮石

各等分

右為細末醋糊丸如桐子大每服三五丸酒下胃  
中痛加當歸煎湯下久服治血癖



又方

代赭石

桃仁

三錢炒  
去皮尖

大黃

五錢

右為末薄荷水為糊丸如桐子大每服三五丸溫水下無時

治產後血悶欲絕

以烏芋搗汁服之

治產後血上搏心悶絕疼痛

以生地黃搗汁飲之

治卒惡血欲死

以鷄蘇一升煮服之

產後積聚癥塊

積聚癥塊夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚為陽氣浮動故痛無常處產後血氣傷於臟腑虛弱為風冷所束搏於臟

腑與血氣相結故成聚積癥塊也

方

桃仁散 治產後餘血不散結成癥塊疼痛

桃仁 當歸 鬼箭羽 大黃 鼈甲

各一兩

赤芍藥 延胡索 琥珀

各三分

川芎

桂心

各半兩

右為粗末每服三大錢水一盞姜三片煎至七分去

滓溫服

京三稜散 治產後積血不散結聚成塊或時寒熱不

思飲食

京三稜

熟地黄

鼈甲各一兩

桂心

當歸

桃仁

三分

川芎

牡丹皮

劉寄奴

赤芍藥

各半

兩

大黃

炒

牛膝

三分

右為粗末每服三錢水一大盞姜黃三片煎至七分候去滓溫服

桂心丸

出聖惠方

治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或

成寒熱四肢羸瘦煩痛不思飲食

青皮 乾漆炒烟出各三分 沒藥 檳榔 當歸 桂心

赤芍藥 牡丹皮各半兩 大黃炒 桃仁 鼈甲

厚朴 三稜 延胡索各一兩

右為細末入臼中細研以好醋煮麵糊為丸如梧桐子大溫酒下三十九

硃砂丸出大全良方 治產後虛中有積結成諸疾

黑附子 桂心 白姜各半兩 巴豆一錢醋浸煮去皮尖

右為細末入巴豆研停醋煮麵糊丸如麻子每服三

九或至五九冷茶下服之取瀉為度

產後血氣不通當時不甚覺如再產出血少皆成癥結

心腹痛硬乍寒乍熱餘氣不進不生肌肉心腹有時

刺痛口乾粘手足沉重有狀熱者宜服此方

出大全良方

當歸 芍藥 甘草 牛膝 鬼箭羽

人參

各三分

牡丹皮

虎杖

白朮

各六分

大黃

水蛭

炒

蒲黃

各三分

蜚蠊

十四枚製

乾地黃

七分朴硝一分

烏梅肉

炒

白薇

桂心

各四分

右為末煉蜜丸如桐子大空心酒服二十九日兩服  
外臺有赤石脂十分

禹餘糧丸

出聖惠方

治婦人產後積冷堅癖

禹餘糧

烏賊骨

吳茱萸

各三兩半

當歸

白朮

細辛 乾地黃 人參 芍藥 芎藭

前胡

各一兩去須

麝虫

一兩 桂心

蜀椒

各二兩半

右為末煉蜜丸桐子大每服二十九空心溫酒送下  
二十九日三不知則加之

五加皮酒 治產後癰瘦

五加皮

斤一

枸杞子

升一

蛇床子

升一

杜仲

炒一

亂麻

斤半

乾地黄

丹參

各二

乾姜

三

天門冬

四

右㕮咀以絹袋子盛酒三斗積三宿一服日再稍加

至十合住

鼈甲散

出聖惠方

治產後小腹內惡血積聚成塊堅硬疼痛

脹滿

鼈甲

一兩

塗醋炙

桃仁

一兩

湯浸去皮尖

雙仁麩炒微黃



川大黃

三兩剉碎  
醋拌炒乾

吳茱萸

一分湯浸七  
遍焙乾微炒

桂心

一兩

鬼箭羽

一兩  
去苗

當歸

一兩剉  
微炒

蒼朮子

一兩

右為散每服三錢水酒各半中盞入生姜片半分同

煎至六分去滓食前稍熱服

水蛭散

出聖  
惠方

治產後惡血不盡月經日久不通漸成癥

塊臍腹脹硬時時疼痛

水蛭

八十枚  
炒令黃

蜚蠊

八十枚去  
翅足微炒

牛膝

一兩  
去苗

牡丹皮

半兩

桃仁

三分湯浸去皮  
尖麩炒微黃

蒼朮子

一兩  
兩鼈甲

一兩塗醋炙  
令黃去裙襖

桂心

半兩

當歸

一兩剉

乾漆

一兩搗碎

鬼箭羽

三分

琥珀

三分

吳茱萸

半兩湯浸七

麝香

一分

右為散入研了藥令勻每服食前以溫酒調下一錢

木香丸

出聖惠方

治產後惡血不散積聚成塊在臍腹下堅

硬疼痛

木香

半兩

京三稜

一兩

檳榔

一兩

桂心

半兩

水蛭

一分微炒令黃

附子

一兩炮製去皮臍

沒藥

半兩

阿魏

半兩麪熟為度

芎藭

半兩

桃仁

一兩湯浸去皮尖

雙仁麪炒微黃

鼈甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

牡丹

半兩

蜜蟲

一分去翅  
足微炒

當歸

剉微炒  
半兩

赤芍藥

半兩  
兩  
研砂  
細研

川大黃

一兩半剉  
碎微炒

乾漆

一兩搗碎微  
炒令烟出

右為末煉蜜和搗五七百杵為丸如梧桐子大每服

溫酒調下二十九日三四服

鼈甲丸

出聖  
惠方

治產後積聚按之躍手食飲無味肌膚三

黃不耐勞苦嘔逆上氣月水閉塞

鼈甲

一兩半塗醋炙  
令黃去諸襖

川大黃

一兩  
炒

赤芍藥

半兩

乾漆

一兩搗碎  
炒烟出

乾熟地黃

芎藭

半兩

延胡索

半兩

桂心

兩半

牡丹

兩半

蟾蜍

十四枚

微炒

蜜蟲

十四枚

微炒

水蛭

一分炒

當歸

三分

乾姜

半兩

炮

製

令黃

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食

前以溫酒調下十丸

桃仁煎

出聖惠方

治產後惡血結成癥塊羸瘦無力

桃仁

四十九枚

湯浸去

皮尖雙仁

研入膏

生地黄汁

二升

生牛膝汁

一升

白蜜

五兩

已上四味同於石鍋中慢火熬如稀餈

鼈甲

一兩半塗醋炙  
令黃去裙襴

京三稜

一兩微煨剉

當歸

一兩微炒剉

延胡索

一兩搗碎炒

令黃去裙襴

芫花

半兩醋拌炒乾

檳榔

一兩

水蛭

四十九枚炒令黃

蜜蟲

四十九枚去翅足微炒

川大黃

一兩剉碎微炒

桂心

一兩琥珀

一兩

右為末入前煎中溲和搗三百杵為丸如梧桐子

大每服食前以溫酒下二十丸

乾漆丸

出聖惠方

治產後惡血不散結成癥塊經脉不利

乾漆

一兩搗碎炒令出烟

牡丹皮

三分

赤芍藥

一兩

蟻螯

十五枚微炒

琥珀一兩 桃仁一兩 雙雙 麩炒微黃 牛膝一兩 桂心三

吳茱萸一分 湯浸七遍 炒 川大黃一兩 剉 蜜蟲十五枚 翅足微炒

水蛭三十枚 炒令黃 蒼蘭子一兩 亂髮灰一錢 磨虫三十五枚 微炒

大麻仁半兩 鼈甲一兩 塗醋炙 令黃去裙襴

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心以溫酒下

芫花散出聖惠方 治產後腹中有癥塊疼痛不可忍

芫花一兩 醋一兩 拌炒乾 川烏頭一兩 炮製 去皮臍 木香一兩 蓬莪茂一兩

乾姜一兩 炮製 劉寄奴半兩 桂心一兩 當歸一兩 剉炒 沒藥一兩

右為末先以米醋五升於銀鍋中煎如稀餚後下藥

搗三二百杵丸如菉豆大每服以溫酒下十九

琥珀丸

出聖惠方

治產後惡血不散積聚成塊

琥珀

一兩

赤芍藥

一兩

桂心

一兩

當歸

一兩

剉

硃砂

一兩

研

乾漆

二兩

搗碎

蜜蟲

三分

去翅

水蛭

三分

炒

令黃

鼈甲

一兩

塗醋炙

桃仁

三兩

湯浸去皮尖

雙仁麤炒

微黃

大黃

一兩

半

右為細末煉蜜和搗三四百杵為丸如梧桐子大每

服空心及晚食前以溫酒下二十九

硃砂丸

出聖惠方

治產後聚積癥塊疼痛

硃砂

五兩望淨夥稠者以固濟了瓷瓶一用獨掃灰內瓶子中可一半安硃砂在中心又以

灰三之後蓋瓶口以武文火斷令通赤待冷取出細研如粉

桂心

兩半麝香一分細研

川大黃

半兩剉碎微炒

乾姜

一分炮製判

當歸

半兩剉微炒

芫花

半兩醋拌炒乾

右為末入研了藥令勻以酒煮蒸餅和為丸如菉豆

大每服空心以酒下五丸不飲酒荊芥湯下亦得

三稜丸

出聖惠方

治產後癥塊



京三稜

一兩微煨剉

木香

半兩研砂

三分細研

芫花

半兩醋拌炒乾

巴豆

一分去心皮按裏壓出油

右為末研入前件硃砂巴豆勻以米醋二升熬令減半下諸藥慢火熬冷調可丸即丸如菉豆大每服空心以醋湯下二丸

大黃煎

出聖惠方

治產後積聚血塊攻心腹發即令人悶絕

兼破鬼胎等病

川大黃

一兩剉碎微炒

芫花

一兩醋拌炒令乾

蓬莪茂

一兩鹹消

一兩

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙麩炒微黃

米粉

半兩

右為末以醪醋二升於鐵器中慢火熬令稀稠得所下米粉攪勻每日空心以溫酒下一茶匙

乾漆丸

出聖惠方

治產後臍下結硬大如升月經不通成積

聚癥塊羸瘦

乾漆

半斤搗碎炒令烟出搗令末

生地黃

十斤搗絞取汁

右相和煎令勻可丸即丸如桐子大每日空心以溫酒下二十九加至四十九

芫花散

出聖惠方

治產後積聚癥塊腹脇疼痛

芫花

一兩醋拌炒令乾搗羅為末

巴豆

一分去皮心研紙裹壓去油

硃砂

三分細研

右都研令勻以醋煮麴糊和丸如菉豆大每服以醋湯化下二丸兼治敗血衝心煎童子小便下五丸

破癥丸

出聖惠方

治產後積聚癥塊疼痛

硃砂

一兩半

硫黃

一兩兩水銀一錢

右以不着油銚子先下硫磺次下硃砂以火筋攪之

令勻次入水銀又攪炒令稍黑不絕煙便傾出候冷  
細研以醋浸蒸餅和為丸如菉豆大每服食前以當  
歸酒化下三九

黑神散 療產後血塊痛經脉行後腹痛并經脉不調

熟地黄一斤陳生姜半斤

右拌同炒乾為末每服二錢產後烏梅煎湯調下常  
服酒調經脉不通利烏梅荊芥調酒服

療血瘕痛及臍下疼喉不下食

當歸分八桂心 芍藥 麒麟竭 蒲黃各六兩

延胡索四錢

右為細末空心溫酒調下二錢

治產後腹中痼痛

用桂末以溫酒服方寸匕日三子母秘錄同

硃砂斑蝥丸出宣明論治婦人產後喫硬食變作血氣食塊

無問新舊

皂角末三分巴豆四枚硃砂一皂子乾蝮 斑蝥十個

紅娘子

五個水蛭

三個硃砂一錢

右為末蜜和丸都分作十五丸每服一九至二九三  
九以溫酒下初更喫平明取下血化水十年之病治  
之或大便或小便不多

辰砂大紅丸

出宣明論

治產後寒熱暈悶血食塊硬疼痛不

止

硃砂

半入藥  
半為衣

生乾地黄

炮

沒藥

乳香

茯苓

肉桂

玄胡

姜黃

硃砂

各半  
兩

斑貓

一分海馬

半錢

右為末酒煮麪糊為丸如酸棗大每服一九煎當歸酒化下瘀血經水不行煎紅花酒下

神仙感應丸

見和劑方

治產後飲食所傷

右藥亦可旋丸如菜豆大姜湯吞下七丸食後

治產後惡血行少腹中成塊刺痛不可勝忍

出護命方

鼈甲

一兩研砂化醋炙黃為丸

官桂

牛膝

川芎

當歸

牡丹皮

去心

延胡索

檳榔

棟子

各半兩

狼毒

十銖

芫花

一兩半

大黃

一分醋炙

麝香

去毛去一銖

狼毒槌碎醋三碗同羌花土器內煮乾炒令黃

右件藥依法修製先於乳鉢內研羌花狼毒麝香共為細末所餘藥只作一處杵相袞羌花等令勻每服用三錢於土器內濃煎湯調下空心服

桃仁粥方

出十便良方

治產後血癥疼痛不多食

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙

粳米

二合

右水二大盞爛研桃仁絞取汁作粥空心食之

牡蒙圓

出千金方

治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷



氣寒氣或產後未滿百日胞絡惡血未盡便利懸園上  
及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛為之積聚小如  
鷄子大者如拳頭按之觸手隱隱然或如蟲嚙或如  
針刺氣時搶心頭脇腹滿不能食飲食不消化上下  
通流或自胃腕痛連玉門背膊嘔逆動氣汗出少腹  
苦寒胞中創欬引陰痛小便自出玉門不正令人無  
子腰膝疼痛四肢沉重淫躍一身盡腫下來乍去大  
便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃白

赤黑等如豆汁夢想不祥方 一名紫蓋丸

牡蒙 厚朴 消石 前胡 乾姜 麋虫

牡丹 蜀椒 黃芩 桔梗 茯苓 細辛

葶藶 人參 芍藥 吳茱萸 桂心 各十八銖

大黃 二兩半 附子 一兩六銖 當歸

右二十味為末蜜和更搗萬杵丸如梧桐子大空心  
溫酒下三九日三不知則加之至五六丸下青黃赤  
白物如魚子者病根出矣

治產後服中有塊痛

出本草

用繁蔓以酒炒絞取汁溫服

治產後血氣衝心癥瘕血氣成塊

出本草

以櫚木煮汁熱服

主破血因產後血不盡結瘕者

出本草

以石刺木根皮煮汁服之

治產後惡露不盡有餘血結塊疼痛

出本草方見前卷本門產後惡露不

絕類

產後血風血虛浮腫 附論

夫產後四肢浮腫者何答曰產後有敗血乘虛停積於五臟循經流入四肢留注日深却還不得腐壞如水故令面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水氣多用導水藥夫產後已虛極虛而又以藥虛之是謂虛腫往往因致夭枉但服小調經散血行腫消則愈○產後勞傷血氣腠理虛則為風邪所乘邪搏於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚熱如

灸則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便瘥也

方

小調經散

出經驗良方

治產後浮腫多端有自懷妊腫至產

後不退者亦有於產後失於將理外感寒暑風濕內  
作喜怒憂驚血與氣相搏留滯經絡氣分血分要當  
隨證治之瘥小調經散治血分固効但力淺難憑不  
若與吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要也。又  
治產後血上壅心不受觸致心煩躁卧起不安如見

鬼神言語顛倒

沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸 各一錢 細辛

麝香

各半錢  
一方無

右為末每服半錢生姜汁溫酒各少調停服大抵產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水氣多以導水藥極是虛人況產後本虛又以藥虛之可謂重虛徃徃因致枉夭但服此藥血行腫自消又去血過多心虛易驚加生龍腦煎

服四肢浮腫加甘草鮑氏方有評曰產後腫證多端  
當治所因治之有血分氣分當辨調經散治血分固  
効力淺爾

治產後遍身青腫疼痛產後血水疾

出大全良方

乾漆 大麥蘖

等分

右各為細末以新瓦礮子中鋪一重麥蘖一重乾漆  
如此填滿用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散但是  
產後諸疾熱酒調下二錢

治產後血虛氣腫水腫

澤蘭葉 防風

右等分為末每服一錢溫酒調不能飲者醋湯調亦可

漢防己散

出大全良方

治產後氣虛血壅上攻心頭面浮腫

漢防己

猪苓

枳殼

桑白皮

各一兩

商陸

甘草

右為粗末每服四錢水一盞半生姜三片煎至七分



去滓溫服空心

沉香散

便產  
須知

治產後血未盡分入四肢腫腹脹氣急

沉香

三錢

川芎

半兩

桂心

半兩

白芍藥

半兩

甘草

三錢

當歸

半兩

牡丹皮

十一銖

蒲黃

半兩炒

右為細末溫酒調下二錢以血去腫消為効

奪魂散

出三  
因方

治婦人產後虛腫喘促利小便則愈

生薑

三兩  
取汁

白麴

三兩

半夏

七個湯洗  
七次用

右用姜汁搜麴畏半夏為七餅子炙焦為末熟水調

一錢服取小便利為効

大調經散

產經

治產後腫滿喘急煩渴小便不利乍寒乍

熱榮衛不和不可輕忽若敗血不散豈止入心脾二臟  
大抵一陰一陽陰勝陽作寒陽勝陰作熱以致敗血循經  
流注閉諸陽則熱閉諸陰則寒榮與衛和則體適再  
會而復作如諸藥不效以大調經散治之血虛惡露  
未消氣未復敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發  
熱或自汗或腫滿皆榮衛未平故也

大豆

炒去皮  
一兩半

茯神

一琥珀  
一錢

右為末濃煎烏豆紫蘇湯調下

治婦人產後四肢虛腫

荊芥

一甘草  
一兩

右為細末每服二錢用茶清調下

防已湯 治產後通身腫滿氣喘煩悶

防已

枳殼

去穰  
麩炒

桑根白皮

剉

姜

當歸

焙各  
一兩

葶藶

隔紙炒  
一分

木香

半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞棗二枚擘破煎至七分  
濾去滓溫服以疎利腫消為度又曰產後血氣俱虛  
寒濕客搏以致脾胃怯弱不能播散諸氣使水與血  
不分流溢肌膚故為腫滿利其小水則病可愈

大腹皮湯 治產後腫滿因宿有抑鬱滯留結不散變  
為浮腫煩悶欬逆惡血不行

大腹皮 赤茯苓 去黑皮 當歸 切焙 紫蘇莖葉 甘草

青橘皮

湯浸去白皮

木通

剉各一兩

桑根白皮

剉

木香

檳榔

剉

大黃

剉炒各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日

三

羌活湯 治產後浮腫煩悶

羌活

去蘆頭

青橘皮

去白麩炒各半兩

生乾地黃

焙

白朮

剉各一兩

桑根白皮

一兩 木香

牽牛

微炒

訶梨勒

微炒

赤茯苓

去黑皮各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時

防已枳殼湯 治產後腫滿咳嗽

防已一兩枳殼去穢二兩 麩炒桑根白皮判當歸切焙各一兩

木香半兩紫蘇莖判檳榔判各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

不拘時

貝母湯 治產後腫滿喘急咳嗽

貝母去心桑根白皮判紫苑赤茯苓去黑皮

五味子

各一兩

杏仁

去皮尖雙仁令別研

人參

各一兩半

葶藶

隔紙炒半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時

牽牛子丸

治產後遍身腫滿

牽牛子

半生半熟

枳殼

去穰麩炒各一兩

當歸

切焙芎藭

生乾地黃

焙

桑根白皮

剉

木香

防已

訶梨勒

炮去核各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎桑根白皮湯化下不拘時

羚羊角湯 治產後腫滿心悶煩渴傷胃不利

羚羊角屑 延胡索 枳殼去穢炒芍藥 檳榔剉

劉寄奴 桑根白皮剉等分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

枳殼丸 治產後腫滿煩悶咳嗽



枳殼去穰  
麩炒

防已

各一兩

訶梨勒皮

半兩

桑根白皮

剉一兩

大黃

炒一兩

當歸

切焙二兩

郁李仁

去皮別研半兩

右除研外搗羅為末拌勻煉蜜丸如梧桐子大每服用二十九生姜紫蘇湯下不拘時

商陸湯 治產後通身暴腫煩悶不食

商陸根

剉二兩

防風

去皮一兩

甘草

炙半兩

附子

炮製去皮臍一枚

赤小豆

二合

麻子仁

三合

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一盞去

滓溫服不拘時

乾地黃湯 治產後遍身頭面浮腫

乾地黃

焙

生姜

白朮

芍藥

赤茯苓

去黑皮 各一兩

桑根白皮

剉二兩

甘草

剉半兩

赤小豆

合五兩

黃耆

剉二兩

商陸根

剉二兩

右都用粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

貝母丸 治產後頭面四肢腫滿氣喘咳嗽

貝母

去心

赤茯苓

去黑皮各二兩

紫苑

杏仁

去皮尖雙炒別研膏

五味子

桑根白皮

剉

人參

各一兩

大棗

一十枚煮熟去

皮核別研膏

右除研二味外搗羅為末以杏仁棗膏拌如乾更入煉蜜少許為丸如桐子大每服二十九至三十九濃煎商陸根湯化下不拘時

枳殼丸

治產後頭面浮腫兩脇痛

枳殼

去穰麩炒一兩一分

訶梨勒

煨去核二兩

當歸

切焙

大黃

剉炒

防已

芍藥

微炒各三分

郁李仁

酒浸去皮一兩

木香

芎藭

甘草

炙剉各半兩

牽牛子

一兩炒搗取半兩用

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎桑白

皮湯化下加至三十丸

防已湯 治產後腫滿不能食

防已

二兩

防風

去皮

芎藭

附子

炮製去皮臍

甘草

炙剉

當歸

切焙

陳橘皮

去白焙各二兩

赤小豆

揀二合

右吹咀如麻豆每服三錢水一盞入生姜三片同煎

至六分候去滓食前溫服

柘黃湯 治產後血風通身浮腫

柘黃

枳殼

去穰

白朮

地丁

各一兩半

黃耆

剉

人參

款冬花

桔梗

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不

拘時

治婦人敗血流溢遍身腫謂之血分

芫花

當歸

羌活

芍藥

青皮

肉桂

蒲黃 大腹子 玄胡索 熟地黃

右為細末每服半錢空心服

治產後腫痛滿

出肘後方

用黑豆一斗五升煮取五升澄清去滓如此三度不  
令有濁再以清酒五升合煮煎二升分五服

大腹皮散

出聖惠方

治產後風氣虛滯頭面四肢浮腫氣喘

促不思飲食

大腹皮

一兩剉

天蓼木

半兩剉

白薇

半兩

猪苓

一兩去黑皮

杏仁

半兩湯浸去尖

雙麩炒微黃

檳榔

半兩

枳殼

三分麩炒微黃去穢

桑根白皮

一兩剉

紫蘇葉

半兩

麻黃

半兩去節根

細辛

半兩

甘草

半兩微赤剉

右搗篩為散每服三錢水一中盞入生姜半分同煎

至六分去滓不拘時溫服

商陸散

出聖惠方

治產後風虛壅通身浮腫不能飲食

商陸

一分用白色者

赤小豆

一分生用

大麻仁

一分合

附子

半兩炮去皮臍

甘草

一分炙微赤剉

防風

一分去蘆頭

桑根白皮

一分剉

右搗篩每服四錢以水一盞入生姜半分同煎至六分去滓不拘時溫服

郁李仁散

出聖惠方

治產後風虛頭面四肢浮腫坐卧不穩

郁李仁

一兩湯浸去皮

防風

去蘆頭三分

羌活

三分

赤茯苓

一兩

商陸

一兩澤瀉三分

漢防己

半兩

木香

半兩

檳榔

半兩

右搗篩為散先用赤小豆一升以水五升煮小豆至

爛取汁二升每服用藥三錢小豆汁一盞煎至六分

濾去滓溫服日三服



紫苑散

出聖惠方

治產後風虛遍身浮腫上氣喘咳腹脇煩

悶不思飲食四肢少力

紫苑

一兩去苗土

漢防己

半兩

桂心

半兩

細辛

半兩

檳榔

三分

赤茯苓

半兩

桑根白皮

半兩

枳殼

半兩

黃芩

半兩

麝香

微

大腹皮

半兩

甜葶藶

半兩

木香

半兩

甘草

半兩

微剉

炙

右搗篩為散每服三錢水一中盞入生姜皮半分共

煎至六分去滓不拘時溫服

檳榔丸

出聖惠方

治產後風虛頭面腫兩脇刺痛四肢煩痛

不欲飲食

檳榔

一分

枳殼

三分

訶梨勒皮

一分

當歸

半兩

陳橘皮

一分

川大黃

一分

郁李仁

三分

木香

半兩

桑根白皮

一分

牽牛子

一分

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵九如梧桐子大每

服須於食前以生姜橘皮湯下二十丸

澤漆丸

出聖惠方

治產後風虛面浮腫心胃不利少思飲食

澤漆

一分

漢防己

三分

郁李仁

一分

防風

半兩

蘆頭

細辛

半兩

前胡

一兩去蘆頭

赤茯苓

桑根白皮

一兩剉

訶梨勒皮

一兩一枳殼

三分麩炒微黃去穢

木香

三分檳榔一兩

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每於食前以生姜湯下三十丸

治產後肌膚浮腫

用柑皮為末酒服之

評曰產後浮腫多端有自懷孕時即腫直至產後不退者有產後失于將理外感寒暑內傷喜怒憂驚血

氣相搏留滯經絡氣分血分不可不細辨調經散只  
治血分如未退枳朮湯奪魂散大調經散皆緊要藥  
也枳朮湯治心下堅大如盤旋轉不定名曰氣分大

全良

方

枳實

炮去穢  
二錢半

白朮

五錢

計七錢半剉末作三服水一盞半煎七分溫服

調經散

出鮑  
氏方

四肢浮腫急用此方

沒藥

研

琥珀

研

桂心

赤芍藥

一錢

當歸

一錢

細辛

麝香

半錢

右為末每服半錢匕生姜汁溫酒各少許調下治敗血流注而成浮腫

評曰產後腫證多端當隨所因致之有血分氣分當辨調經散治血分固効但力淺爾如臟經暴虛外感內傷血氣流滯或腹痛嘔利宜加減茱萸湯

吳茱萸

一兩半

枳殼

乾姜

麥門冬

當歸

酒浸焙

防風 細辛 茯苓 牡丹皮 桂心 甘草

半夏

湯浸七次  
各半兩

右為末每服四錢煎食前熱服或因水飲所作心下

堅大宜枳木湯

枳實

一兩半

白朮

三兩

右為散每服四錢煎溫服腹中軟即散或虛腫喘促

宜奪魂散

生姜

三兩  
取汁

白朮

三兩

半夏

七枚  
破

右以姜汁搜半夏及朮作餅子炙焦熟研為末湯調

下一錢旋利愈或腫滿喘急煩渴者宜大調經湯  
見方

前

獨活湯

出本草

治產後風虛

以獨活三兩水三升煮取一升半分作三服耐酒者  
可以酒水各半煮之佳

治身上浮風

出本草

以芋煮汁浴之慎風半日許

白鮮皮湯

出本草

治產後風虛

以白蘚皮三兩水三升煮取一升半分作三服耐酒者可以酒水各半煮之佳

產後兒枕腹痛

附論

夫兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臟腑風冷使血凝滯在於小腹不能流通則令結聚疼痛名曰兒枕也

方

延胡索散

出永類  
鈴方

治產後兒枕腹痛不止久則變成癥



瘕得効

延胡索

當歸

各一兩

真琥珀

蒲黃

各一分

桂心

三分

赤芍藥

半兩

紅藍花

二錢

右為細末以童子小便合好陳酒煎溫調下三錢食

前服

治產後兒枕亦治赤白痢

丁香

三錢

嬰粟殼

去穰蜜炙

香白芷

各半兩

百草霜

六錢

右為細末每服二錢童子小便調下如痢疾米飲下

治產後兒枕痛不可忍立效散

出危氏方

用五靈脂慢火熬為細末每服二錢溫酒調下

定痛散

出便產須知

治產後三五日但覺腹中痛兒枕未定

或惡血未止

當歸

一芍藥一錢一肉桂半錢

右為末與酒共一盞姜一塊彈大拍破同煎至六分

俟溫服如體熱以芎代桂

當歸散

出聖惠方

治產後敗血不散兒枕塊硬痛發歇及新

產體虛風寒內搏惡露不快臍腹堅

紅藍花

鬼箭

去中心木

當歸

去苗炒各一兩

右為粗散每服三錢酒一大盞煎至七分去滓食前

溫服

二聖散

一名延胡索散出聖惠方

治兒枕痛不可忍

當歸

洗

肉桂

去皮

玄胡索

炒等分

右為細末每服二錢熱酒或童子小便調下又一方

為咬咀入生姜半分同煎去滓不拘時

牡丹散

出聖惠方

治新產兒枕上下刺痛狀熱口乾煩渴頭

汗出或大小便不利未得便下但與童子小便頻服

其病亦順若風血相搏其病未愈宜服

牡丹

半兩

玄參

半兩

黃芩

芍藥

射干

各半兩

蘧麥

半兩

赤芍藥

三分

川大黃

三分剉

海藻

半兩洗去鹹味

水蛭

一分炒

蜜蟲

一分炒令微黃翅足去

蟬蛸

二十枚微炒

桃仁

半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右粗羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分薄

荷三七葉同煎至六分去滓溫服日三四服

木香散

出聖惠方

治產後心腹不利兒枕痛

木香

一分當歸

一兩剉微炒

赤芍藥

半兩

芍藥

三分

桂心

半兩

右麤搗羅為散每服三錢以水酒各半中盞入生姜

半分同煎至六分去滓溫服日三四服

麒麟竭散

出聖惠方

治產後腹中有凝血不散疔刺疼痛名

為兒枕宜服

麒麟竭

半兩

當歸

半兩微炒

桂心

半兩

荷葉

半兩

大黃

半兩微炒

右搗羅為散不計時候以紅藍浸酒調下一錢

又方

出聖惠方

牡丹

半兩

水蛭

一分

炒

當歸

半兩

剉

川大黃

半兩

剉

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢

又方

益母草

一兩

生地黃

乾一兩

牛膝

二兩

川大黃

一兩

剉

炒

剉

當歸

一兩

剉

桂心

半兩

沒藥

一兩

剉

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢

又方

蒲黃

兩半

桃仁

雙半

湯浸去皮尖

微炒

微黃

牡丹

兩半

桂心

兩半

川大黃

兩半

剉

微炒

當歸

兩半

剉

微炒

微炒

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢

又方

菴蘭子

一兩

當歸

三分

剉

微黃

赤芍藥

兩半

姜黃

兩半

芍藥

兩半

剉

微炒

微黃

微炒

右為細散不計時候以熱酒調下一錢

桂心散 治產後兒枕攻刺腹痛不止

桂心

三分

赤芍藥

兩

琥珀

半兩  
細研

白芷

半兩

當歸

一分  
剉  
微炒

右搗篩為散每服二錢以水一中盞入生姜半分棗

二枚同煎至六分去滓不計時候服

姜粉散

纔產後服此湯消兒枕除百病

當歸

人參

木香

黃耆

川芎

甘草

茯苓

芍藥

桂心

知母

大黃

草豆蔻

白朮

訶子

良姜

青皮

熟地黃

少許  
附子  
半兩

右除地黃附子外各等分焙乾生姜一片研取自然



升<sub>方發</sub>中傳留食頃去清汁取下面粉<sub>即推</sub>撲在弱

葉中二味焙極乾搗羅為末纔產後用藥三錢水一  
盞姜三片棗一枚煎至七分熱服後產母自然睡去  
半日以來睡覺再服全除腹痛每日只三服過九日  
不可服肚中冷也

失笑散 治產後兒枕痛

方見  
氣類

用米醋童孺小便各半盞調服

烏金散 治惡露敗血刺心腹兒枕痛坐卧不得動餘

血不快

川姜

七錢半燒  
焦存性

黑附子

半枚炮  
去皮尖

細末挑三錢童子小便浸酒調下痛止血方住服

秦艽湯

治偶傷風惡熱渾身疼痛

熟地黃

三錢當歸

白芍藥

秦艽

去蘆皮

柴胡

甘草

地骨皮

去土各  
一錢半

計一兩二錢挑五錢水一盞半煎八分日進三服熱

退住服或四物湯加蘇木煎服亦治

黑白散 治產後兒枕太痛

烏金石

燒紅錯七遍  
另為細末

寒水石

燒存性末

右二味各等分另頓放臨卧各炒一錢半粥飲調下  
痛止便不可服未止再服立効

醋煎散 治婦人血氣腹脇刺痛不可忍者及產後敗  
血兒枕急痛並宜服之

高良姜

一兩 當歸

洗焙去粗皮

白芍藥

陳橘皮

去白

烏藥

五味各半兩

右件為細末每服三錢水半盞醋半盞同煎至七分  
通口服不拘時候

延胡索散 治惡露敗血走刺心腹兒枕痛坐卧不得  
乾姜三分燒蓋瓶中存性附子半個炮細末童便調  
下一錢

產後蓐勞

附論

夫產後蓐勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復  
不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏於

血氣則不能溫於肌膚使人虛乏勞倦乍卧乍起顏容  
憔悴飲食不消風冷邪氣而感於肺肺感微寒故咳嗽  
喘之頭痛腹中絞刺口乾百節疼痛榮衛受於風邪流  
注臟腑須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧胸腹煩悶四肢  
不舉沉重著床此則蓐勞之候也產蓐之後食飲起居  
失於常度使血氣不得其養若血虛則發熱氣虛則發  
寒氣血俱虛則寒熱更作日漸羸瘦故為蓐勞也產後惡  
露不盡亦令致此則時寒時熱腰腹刺痛甚者不能食

亦不長肌膚

方

蜀漆湯 治產後虛羸往來心胃煩滿骨節疼痛及頭痛狀熱晡時輒甚如發瘧

蜀漆 桂心 甘草 黃芩

各一兩半 黃耆

五兩

知母 芍藥

各二兩

生地黃

一斤

右咬咀水一斗煮取三升分三服

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛

面色痿黃自汗體倦咳嗽嘔逆腹中攪刺名為虛勞

猪腎

一雙去脂膜  
羊腎亦可用

香豉

一方無此  
味有知母

葱白

粳米

當歸

芍藥

各二兩

右以咀分為兩劑用水三升煮取一小碗去滓分三次服廣濟方無芍藥有人參任意飲屢用效雖至十餘年亦愈不復作

療產後日淺久坐聽視言語多或運用氣力無節及起居勞動太過頭膊肢節皮肉痛乍寒乍熱此為虛勞

猪腎

一雙去脂  
膜四破

當歸

芍藥

生姜

各一兩

葱白

切

桂心

各一兩

右以水八升煮腎取六升下藥煎取二升分為二服

溫服

人參鼈甲散

治婦人產後蓐勞皆由在產內百日未

滿體中虛損血氣尚弱失於將理或運動作勞致成

蓐勞其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目

溫痛發歇無常有盜汗寒熱如瘧背轉拘急沉困在



床服此大効

人參 桂心 當歸 桑寄生 白茯苓 桃仁

白芍藥 熟地黄 甘草 麥門冬

各半兩

續斷 一分 牛膝 三分 鼈甲 炙 黃耆 各一兩

右為細末每服先以猪腎一對去筋膜以水兩大盞  
入生姜半分棗三枚煎至一盞去猪腎姜棗然後再  
入藥末二錢葱三寸烏梅一枚荊芥五穗煎至七分  
去滓空心晚前溫服食前

熟地黃散

治產後皆由內勞體虛氣力未復勞動所

致四肢煩痛時發寒熱不思飲食

熟乾地黃

人參

白芍藥

白茯苓

白朮

各二兩

續斷

黃耆

桂心

五味子

當歸

川芎

麥門冬

各三分

右咬咀每服四錢水一盞生姜三片棗三枚同煎至

七分去滓溫服不拘時

白茯苓散

治產後蓐勞益緣生產日淺久坐多語運

動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀

白茯苓

兩

當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參

各半兩

熟地黄

兩半

右咬咀先以水二盞猪腎一雙去脂膜細切以生姜三片並棗三枚煎取一盞去腎姜棗入藥半兩煮取七分候去滓溫服食前二服

黃耆丸 治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛百骨節痿痺氣力羸乏

黃耆 鼈甲

當歸

到各一兩

桂心

續斷

川芎

白芍藥

牛膝

茯苓

沉香

栝子仁

枳殼

各三分

北五味

熟乾地黄

白朮

半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大食粥飲下四十九  
又一方無白朮

牡丹皮 治婦人產後虛羸發熱自汗欲變羸勞或血

氣所搏及經候不調及寒熱自汗羸瘦並宜服之

白芍藥

當歸

五加皮

地骨皮

人參

各半兩

沒藥

桂心

各二錢

牡丹皮

二錢

右為細末每服二錢水酒各半盞不飲酒只用清水一盞開通錢一錢麻由蘸之同煎至七分去滓通口服下煎不得攪喫不得吹

梁豉湯

治產後虛羸喘乏寒熱如瘧名曰蓐勞

猪腎

一具切去筋

淡豉

五合綿裹

白梁米

三合葱白

切一升

人參

當歸

右水三升煎八合分二服

五積散 治感寒傷食憂恐驚怒身發痛熱頭疼不宜峻劑凡蓐勞者服之

白芷 川芎 甘草 茯苓 當歸 肉桂

炙 去粗皮 去蘆 去粗皮

芍藥 半夏 陳皮 白朮

湯浸七次 各三兩 去粗皮 去蘆頭

麻黃 蒼朮 乾姜

去根節 各六兩 米泔浸去 皮二十兩 炮四

桔梗 厚朴

去蘆頭 十二兩 去粗皮 四兩

右咬咀白水煎加醋同服妙

猪腰子粥 治產後蓐勞發熱

用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片鹽酒拌之須先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子挽底用熱粥冲令鹹淡適中每日清晨空心食之極妙服宜烏豆散如熱入血室宜小柴胡湯

猪腎湯 治產後虛羸喘乏乍寒乍熱病如瘧狀名蓐勞

猪腎

一具去脂四破  
如無羊腎代

香豉

綿

白粳

葱白

各一兩

右以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥更作廣

濟方復有人參當歸各二兩為六味

桂心散 治產後羸勞日漸枯痺寒熱往來頭疼體痛

口苦舌燥

桂去粗皮

芍藥剉厚朴

去粗皮塗生薑汁炙

柴胡

去枯梗炒

紫花

去土焙乾

高良姜

乾姜

炮製

白蕪荑炒

陳橘皮

湯浸去白用

鼈甲

去裙襴醋浸炙各半兩

草薺寇

三枚去皮

右搗羅為散每服用獐猪肝十片炙熟乘熱拌和藥

旋旋嚼服溫酒下日三



柴胡人參湯 治產後失於將理血虛損日漸困瘁少

寒多熱煩渴嗽逆痰壅減食

柴胡

去苗

人參

生乾地黄

焙各三分

桔梗

剉炒

紫花

去苗土

知母

桑根白皮

枳殼

去穰麩炒令黃

赤芍藥

桂皮

當歸

微炒各半兩

附子

大黃一枚炮製去皮臍

右剉如麻豆每服三錢水一盞生姜三片棗一枚擘

破同煎候至七分去滓溫服不拘時

茯苓丸

治產後蓐勞寒熱羸瘦骨節痠痛

白茯苓

去黑皮

肉蓯蓉

酒浸切焙

熟乾地黄

焙各一兩半

當歸

切炒枳殼

去穢炒

桑上寄生

剉炒

延胡索

粳米炒半兩熟各一兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十九溫酒或米

飲下不拘時服

猪腎湯

治產後蓐勞寒熱體痛力乏瘦黑

猪腎

一雙切

黃耆

剉碎

人參

芍藥

剉碎炒各一兩半

芎藭

一兩

桂

去粗皮三分

當歸

剉炒令香一兩

熟乾地黄

剉碎炒各一兩半

右除腎外搗為麤末每服二錢水二盞先煮猪腎取

一盞去腎再入藥末生姜三片棗一枚擘破同煎七分去滓溫服不拘時

芎胡湯 治產後蓐勞寒熱日漸瘦損

芎胡

去苗剉一兩

甘草

炙剉

人參

白茯苓

去黑皮

當歸

切焙

赤芍藥

剉

枳殼

去穰麩炒

厚朴

去粗皮塗生姜汁炙各三兩

黃耆

三分

右搗粗篩每服三錢水一盞半先煮猪腎一隻取汁一盞用去腎再入藥并生姜三片葱白三寸同煎至七分去滓溫服不拘時

熟乾地黄湯 治產後蓐勞寒熱瘁瘦

熟乾地黄

焙一兩半

麥門冬

去心炒

當歸

切焙 人參

牛膝

去苗剉

白朮

剉炒各一兩

淡竹葉

一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘

時候

黃耆湯 治產後蓐勞肌瘦煩悶喘急多汗倦怠少力

黃耆

剉碎

芍藥

剉碎

枳殼

去皮穰麤炒

牡蠣粉

各一兩

羚羊角屑

半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞半猪脂一枚去筋膜用

生姜五片同煎七分去滓溫服不拘時

黃耆炙散

出聖惠方

治產後羸勞肌肉枯瘦面無顏色或寒

或熱四肢痠痛心煩

黃耆

剉

鼈甲

去裙襴醋炙黃各一兩

當歸

剉微炒

桑寄生

桂

去粗皮

白茯苓

去黑皮

白芍藥

人參

麥門冬

去志焙

熟乾地黄

焙

牛膝

去苗酒浸切焙

甘草

炙各半兩

右為細散每服用猪腎一具切去脂膜先以水一盞

半將生姜三片棗三枚擘煎至一盞去滓并腎却下藥三錢再煎至七分候空心食前溫服二滓並煎服芍藥湯 治產後蓐勞疼痛寒熱頭旋眼昏精神恍惚睡多驚恐盜汗腹痛大便不利

赤芍藥 芍藥 牡丹皮 玄參 當歸

切焙

人參

五味子 麥門冬

去心焙

白茯苓 白薇

甘草

炙剉各一兩

熟地黄

二兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

不拘時候

猪腎湯 治產後蓐勞似瘧寒熱不能食

猪腎

一枚去脂膜

粳米

淘二合

知母

焙三分

當歸

剉焙一分半

葱白

五莖芍藥三分

右除腎并米外剉如麻子豆大以水六盞先煎猪腎至七八沸內諸藥煎取四盞去滓下粳米煮熟去米空心服分三服如行人五六里服訖卧良久

乾地黄丸 治產後蓐勞寒熱體虛羸瘦不思飲食

熟乾地黄

焙

人參

鼈甲

醋炙去  
裙襴

肉蓯蓉

酒浸切  
焙各兩

白朮

炒

續斷

桂

去粗  
皮

附子

炮製去  
皮臍

牛膝

酒浸  
切焙

五味子

當歸

切焙各  
三分

茯苓

去黑皮  
半兩

黃耆

剉一  
兩半

右為末研勻煉蜜和丸如桐子大每服十五丸溫酒  
化下不拘時

白薇丸

治產後蓐勞寒熱時作四體羸弱飲食無味

白薇

栢子仁

研

附子

炮製去  
皮臍

鼈甲

醋炙去  
裙襴

當歸

切

黃耆

剉各  
一兩

人參

桂

去粗  
皮

石斛

去  
根

芍藥

炒



牡丹皮

羌活

去蘆頭  
各三分

熟乾地黄

焙

甘草

炙  
判

肉苁蓉

酒浸切焙  
一兩一分

芎藭

各半  
兩

右為末研細煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫

米飲化下不拘時

澤蘭丸

治產後尊勞補虛損益血氣

澤蘭

一兩  
半

防風

去  
皮

附子

炮製去  
皮臍

當歸

切  
焙

白朮

桂

去粗  
皮

芎藭

栢子仁

熟乾地黄

焙

石斛

去根  
各二兩

厚朴

去粗皮  
姜汁炙

甘草

炙  
判

細辛

去苗葉  
各半兩

人參

乾姜

炮

牛膝

酒浸切焙

肉蓯蓉

酒浸切焙

白芷

黃耆

續斷

各三分

桃仁

去皮尖雙炒四兩

右為末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空

心溫酒下

白朮散

治產後蓐勞虛羸發歇寒熱心腹疼痛四肢

無力不思飲食

白朮

一兩木香

半兩

熟乾地黃

一兩

乾姜

半兩炮製

白芍藥

三分

芎藭

桃仁

半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

人參

三分去蘆頭

桂心

半兩

黃耆

三分剉

當歸

三分剉微炒

白茯苓

三分

右粗搗羅為散每服四錢以水一中盞入生姜半分

棗二枚同煎至六分去滓稍熱服一日三四服

猪腎湯 治產後體虛乍寒乍熱其狀如瘧名曰蓐勞

宜服

猪腎

一對切去脂膜

香豉

半兩

白粳米

半兩

葱白

七寸切

桂心

半兩

薤白

三莖切

生姜

一分切

白芍藥

一分

人參

一兩去蘆

白朮

三分

當歸

一兩剉微炒

黃耆

三分去蘆頭

大棗

四枚擘破

已前六味都以水二盞煎至一盞去滓同煎後藥

腎瀝湯

治產後蓐勞心神煩熱頭痛口乾身體或寒

或熱

積猪腎

一對切去脂膜

豉

半兩

大棗

四枚擘破

生姜

一兩切

葱白

二莖

以上五味用水一盞半煎至一盞去滓用煎後藥

乾熟地黄

焙一兩

桂心

半兩

白朮

半兩

麥門冬

一兩半去心焙

當歸

半兩剉微炒

黃耆

半兩

右搗粗羅為散每服半兩入煎藥汁煎至七分去滓

食前分溫二服

地黃丸 治產後羸勞虛羸氣短胸脇滿悶不思飲食

熟地黃

石斛去根剉

耆剉

白茯苓

麥門冬

去心焙

肉桂

去皺皮

枸杞子

肉蓯蓉

酒浸一宿刮皺皮炙令黃

芎藭

當歸

剉微炒

白芍藥

人參

去蘆頭

續斷

桑寄生

各兩

右搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每

於食前以粥飲下三十丸

羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名羸勞

當歸

人參

各七錢

黃耆

炙一兩

生薑

半兩

以咀用羊肉一觔煮清汁五大盞去肉入藥煎至四盞

再去滓作三次服

又方

當歸

人參

等分

右為末猪腰一隻薄切藥三錢水二盞粳米半合同

煎至一盞汗未出再服

治蓐婦血暈

以芭蕉根搗汁飲之

治蓐中血暈

取猪脂燒灰酒服之立驗已斃者去板齒灌之經一日亦可治產後蓐婦

產後血邪攻心狂語

附論

夫血邪攻心狂語者由產後臟腑俱虛敗血奔衝邪淫於心心不受觸氣血相蒸氣搏於肝神魂不定內外虛亂心氣怯弱因其體虛血邪干於心臟故狂亂見鬼神

也

方

栢子仁散

治產後荒言亂語皆由內虛是血邪上攻

於心也

栢子仁

遠志

去心

人參

去蘆頭

桑寄生

防風

去蘆頭

琥珀

細研

當歸

剉微炒

熟乾地黄

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服以水一大盞入白羊心一枚切先煎至

七分候去滓溫下藥五錢更煎至四分去滓不拘時



候溫服

茯神散

治產後血邪心神恍惚言語無度睡卧不安

茯神

一人參去蘆頭

龍齒

琥珀

赤芍藥

黃耆

牛膝

去苗已上各二分

生乾地黄

半兩桂心半兩

右為散每服用一盞先羊腎三錢以水一中盞同煎至六分去滓不拘時溫服

羊腎湯

治產後狂語如見鬼神皆是體虛心氣不定

邪血所攻

羊腎

一對切去脂膜

遠志

三分去心

白芍藥

三分

熟乾地黄

一兩

黃耆

剉

白茯苓

人參

去蘆頭

防風

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

獨活

羚羊角屑

以上各半兩

右為散每服用一大盞先煎羊腎至七分去腎入藥五錢再煎至四分去滓不拘時溫服

麝香散

治產後血攻心言語無度煩悶不安

麝香

一分

牛黃

一分

硃砂

三分

龍齒

三分

麒麟竭

半兩

右都細研為散不計時以豆淋酒調下一錢

琥珀散 治產後迷悶言語錯亂

琥珀

一兩  
細研

人參

三分  
去蘆頭

遠志

三分  
去心

茯神

三分

鉛粉

一兩

生乾地黄

三分

阿膠

三分  
搗碎  
炒令黃烟

硃砂

半兩  
細研

麝香

一分  
細研

甘草

一分  
炙  
微赤剉

右為細散入研了藥令勻不計時以金銀湯調下一

錢

金烏散 治產後血邪衝心言語不得心神迷悶

烏鴉

一兩  
燒灰

麝香

半兩  
燒灰

虎糞

一兩  
燒灰

右同研令細不計時以童子小便調下一錢

鉛粉丸 治產後體虛血邪攻心狂語或見鬼神

鉛粉

一兩

天竹黃

半兩

真珠末

半兩

地黃

半兩

砒黃

一兩

硃砂

一分

麝香

一分

琥珀

半兩

金箔

二十片

銀箔

二十片

右都研如麩以粟米飯和丸如桐子大不計時候以

竹葉湯下五丸

丹砂丸 治產後血邪攻心迷悶氣不足臟腑虛弱令

人如顛邪怕驚或啼或笑或驚或恐言無準憑狀如

鬼魅宜服

光明硃砂

二兩

白礬

二兩

金箔

五十片

先將硃砂并礬內瓷瓶子中封閉了於甑上每兩度蒸至半月日取出和前金箔細研以粟米軟飯和為丸如菜豆大每服不拘時以麥門冬湯下七丸

麝香散 治產後血邪氣攻心如見鬼神狀候似風亂語不定刺痛脹滿宜服

麝香

一錢細研

烏驢蹄護

一兩燒灰

亂髮

二兩炒灰

乾漆

一兩搗碎炒令烟出

右為細散研入麝香令勻不計時以溫酒調下一錢  
麒麟竭散 治產後血邪攻心恍惚如顛狂

麒麟竭

分蒲黃三分

右相和研令勻細不計時以溫酒調下二錢

治血攻心顛狂不識人宜服此方

赤馬蹄

炒令焦黃

白殭蚕

微炒各一兩

右為細散不計時煎苦參湯調下一錢

又方

延胡索

半兩

狗膽

一分乾者

琥珀

半兩

右為細散不計時以溫酒調下一錢小便調下亦得

茯苓湯 治產後心氣不足血邪上攻眠卧不安

白茯苓

去黑皮

熟地黃

焙各一兩半

甘草

炙

獨活

去蘆頭

遠志

去心

防風

去皮

人參

各半兩

白薇

各一兩

龍齒

半研

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時

治婦人產後發狂

用木香附子去鹽皮淨為末每用二錢再入研極細  
真辰砂末一錢以燒通紅秤錘好酒調服神效

八珍散 治產後血暈心竅言語不正狀如顛狂

人參 石菖蒲 生地黃 川芎

各一兩 硃砂別研

防風

去蘆各半兩 細辛 淨洗

甘草

炙半兩

右為末每服一錢薄荷湯下不拘時地黃多膩隔脾

胃不快者即以當歸代之

黑龍丹

出濟生方

治產後敗血衝心不省人事狂言如癲



當歸

去蘆酒浸

五靈脂

川芎

高良姜

三兩

生地黃

三兩

以上剉入沙鍋內紙筋鹽泥固濟炭火煨令通紅令冷後取出細研入後藥

生硫磺 花藥石 百草霜 乳香 琥珀

右五味一兩一錢細末前後和勻米醋煮麵糊為丸如彈子大每服一九服時再入炭火煨藥通紅入生姜汁內浸碎以無灰酒合童子小便頓服神効不可述

治產後顛狂

出永類  
鈴方

用小柴胡湯加生地黃同煎百餘沸安又有服逍遙散外加遠志桃仁蘇木紅花每服再加一錢重服後再服平胃散安此先理血而後理脾者

寧中膏

出如  
宜方

治產後心志不寧心血耗散如見神鬼

人參


酸棗仁

各一  
兩

辰砂

半  
錢

右為末蜜丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下又宜研琥珀麝香燈心湯下



普濟方卷三百四十九